

COLZANET®

ERBICIDA PER COLZA E CAVOLI

Tipo di formulazione: sospensione concentrata

COLZANET®

Composizione

100 grammi di prodotto contengono
Metazaclor puro g 43,1 (= 500 g/l)
coformulanti q.b. a g 100



Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea – H351 Sospettato di provocare il cancro - H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata – EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso

ATTENZIONE

Consigli di Prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini – P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso – P261 Evitare di respirare gli aerosol – P273 Non disperdere nell'ambiente – P280 Indossare guanti – P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico – P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito – P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale.

Globachem NV

Brustem Industriepark- Lichtenberglaan 2019 3803 Sint-Truiden (Belgium) – tel. +32 11 785717 - globachem@globachem.com

Officina di produzione BASF SE – Ludwigshafen, Germany

Distribuito da:

Agrimix S.r.l. – Via Campobello 1 - 00040 POMEZIA (RM)

Registrazione del Ministero della Salute n. 9952 del 12/02/1999

Contenuto netto: Litri 0,1-0,250-0,5-1-2-5-10

Partita n.

Prescrizioni supplementari: Impiegare il formulato con un livello massimo di 1 kg/ha di sostanza attiva (corrispondente a 2 litri max. di prodotto/ha) ogni 3 anni sullo stesso campo. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso d'intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Avvertenza: Consultare un centro antiveleni**

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il COLZANET esplica la propria azione impedendo la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizzando, subito dopo l'emergenza le plantule delle infestanti: è assorbito dalle radici e dal coleoptile delle avventizie. Viene indicato per combattere le seguenti infestanti: *apera spica-venti*, *alopecurus* spp., *poa* spp., *echinocloa* spp., *lolium* spp., *setaria* spp., *digitaria sanguinalis*, *amaranthus retroflexus*, *capsella bursa-pastoris*, *matricaria* spp., *anthesis* spp., *stellaria* spp., *lamium* spp., *chenopodium* spp., *sonchus* spp., *mercurialis annua*, *solanum* spp., *myosotis* spp., *urtica urens*, *papaver* spp., *polygonum persicaria*, *ranunculus* spp., *veronica*. Per la buona riuscita del trattamento, preparare un letto di semina ben affinato e livellato e di deporre il seme ad una profondità costante; i migliori risultati erbicidi si conseguono al verificarsi di precipitazioni piovose dopo l'intervento diserbante.

COLZA: trattare in pre-emergenza subito dopo la semina ed al più tardi entro tre giorni alla dose di 2 litri in 400-500 litri di acqua per ettaro.

Si può effettuare il trattamento anche in post-emergenza precoce quando la coltura ha sviluppato le prime due foglie vere e con le infestanti ancora allo stadio di plantula.

CAVOLI (esclusi cavoli a foglia e cavoletto di Bruxelles): trattare subito dopo la messa a dimora della coltura e prima del superamento della crisi di trapianto alla dose di 1,5-2 litri in 400-500 litri d'acqua per ettaro, se dopo il trapianto si effettuano abbondanti e frequenti irrigazioni si consiglia l'impiego del dosaggio più basso.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

- Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
- Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con mezzi aerei
- Da non vendersi sfuso
- Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua
- Operare in assenza di vento
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

® Marchio registrato Agrimix