



GERBATHIN 2 LG (BA 2%)

Fitoregolatore stimolante/diradante.

N.Registrazione

Reg. n° 12025 del 27/02/2004 del Min. Salute

Intervallo di sicurezza: non richiesto

Composizione

BA (6-Benziladenina) pura 2 g (=21 g/L)

Coformulanti q. b. a 100 g

Confezioni

FLACONI

12 x 1 L

TANICHE

4 x 5 L

Descrizione prodotto

Fitoregolatore stimolante/diradante.

Modalità d'uso

Il prodotto va impiegato con volumi d'acqua variabili da 300 a 1000 litri per ettaro in funzione dello sviluppo delle piante. La quantità finale di soluzione per ettaro deve essere regolata in funzione dello sviluppo delle piante e della forma di allevamento.

Per favorire l'emissione dei nuovi rami il trattamento va eseguito dopo un'abbondante pioggia o irrigazione e dovrà essere preceduto o seguito da una concimazione azotata.

Ripetere l'applicazione se entro 24 ore dal trattamento cadono più di 5 mm di pioggia.

COMPATIBILITÀ

GERBATHIN 2 LG è compatibile con prodotti a base di acido naftalenacetico. Inoltre, può essere fatto precedere da prodotti a base di amide dell'acido naftalenacetico.

Avvertenze



Indicazioni di pericolo: H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Coltura	Impiego	Dosaggio	Trattamento
Melo	Fogliare	250-1000 ml/hl	Per il diradamento dei frutti effettuare il trattamento quando i frutticini sui rami di 2 o più anni abbiano raggiunto il diametro di 12-14 mm. Maggiore efficacia può essere raggiunta se GerBathin 2 LG è associato a Dirager® o impiegato dopo un trattamento con Diramid® o Geramid®- Neu.
Melo	Fogliare	500 ml/hl	Per anticipare l'emissione di branchette. Effettuare 3 interventi a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. La prima applicazione va effettuata quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di circa 5-7 cm e 4-8 foglie non ancora completamente distese. Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 750-1 L di prodotto diluiti in 20 litri d'acqua, spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento.
Pero	Fogliare	750 ml/hl	Per anticipare l'emissione di branchette. Effettuare 3 interventi a distanza di 5-7 giorni l'uno dall'altro. La prima applicazione va effettuata quando i getti sviluppati dalla gemma apicale hanno una lunghezza di circa 5-7 cm e 4-8 foglie non ancora completamente distese. Il prodotto può essere impiegato anche con trattamenti localizzati alla gemma apicale delle piante alla dose di 750-1 L di prodotto diluiti in 20 litri d'acqua, spruzzando almeno 0,5 ml di soluzione per bagnare bene la gemma ed avere un leggero gocciolamento.

Note aggiuntive prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle Indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati in etichetta.