

GIBAI FAR

Fitoregolatore idrodispersibile stimolante ad azione polivalente. Si impiega in trattamenti liquidi.

COMPOSIZIONE

- Acido Gibberellico puro g 2
- Solvente q.b. a g 100

**ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Registrazione Ministero della Salute n° 5282 del 16/3/1983

Titolare della Registrazione
AIFAR AGROCHIMICA SRL
 Via Bazzano 12 - Ronco Scrivia (GE)
 Tel.010.935.0267

Stabilimento di produzione: Aifar Agrochimica srl - Via Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia (GE)

Taglie: 100 – 250 mL; 1 – 5 – 20 Litri

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Conservare fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme vigenti.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Aspettare che il prodotto applicato depositato sulla superficie delle foglie sia completamente asciugato prima di far rientrare i lavoratori. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

A causa della diversa rispondenza delle diverse colture/varietà e delle zone di coltivazione, si consiglia di effettuare un saggio su piccole superfici prima di utilizzare il prodotto su larga scala.

VITE: l'impiego del prodotto ha lo scopo di ingrossare e distanziare gli acini (con effetto sulla riduzione dello sviluppo delle infezioni da *Botrytis*), allungare il grappolo e migliorare la produzione.

Uva da tavola senza semi:

- per le varietà più sensibili, con trattamenti localizzati sul grappolo, utilizzare il prodotto alla dose di 2.5-100 mL/hL (0.5-6 g sa/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti per stagione ad intervalli di 2-3 giorni, durante la fase della fioritura e fino alla chiusura del grappolo;
- per varietà più resistenti, con trattamenti sull'intera coltura, utilizzare il prodotto alla dose di 200-312.5 mL/hL (40-50 g sa/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti per stagione ad

intervalli di 7 giorni, durante la fase della fioritura e fino alla chiusura del grappolo.

Spruzzare i nuovi germogli quando questi hanno raggiunto una lunghezza di 5-10 cm.

Avvertenze: non variare la dose e non trattare in periodi diversi da quelli indicati.

Uva da tavola con semi: trattare allo scopo di:

- allungare il rachide: in pre-fioritura con tralci di 4-8 cm alla dose di 20-25 mL/hL (4 g sa/ha);
- diradare il grappolo: trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 30-37.5 mL/hL (6 g sa/ha);
- per aumentare le dimensioni degli acini: dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, alla dose di 40-50 mL/hL (8 g sa/ha).

Effettuare al massimo 4 trattamenti per stagione ad intervalli di 7 giorni.

Sulla vite effettuare preferibilmente trattamenti diretti ai grappoli onde evitare eventuali influenze sfavorevoli sulle gemme dei tralci in formazione che si devono sviluppare nell'annata successiva.

AGRUMI: applicare il prodotto alla dose di 50 mL/hL (15 g sa/ha) al fine di:

- favorire l'allegagione: trattare quando la maggior parte dei fiori sono aperti e inizia la perdita dei petali;
- avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione/colorazione: trattare poco prima della colorazione dei frutti, avendo cura di bagnare abbondantemente.

Effettuare al massimo 3 trattamenti all'anno ad intervalli di 7 giorni.

CARCIOFO: per anticipare l'epoca di raccolta impiegare il prodotto alla dose di 50 mL/hL (8 g sa/ha) effettuando il trattamento alla comparsa delle infiorescenze.

Il trattamento si può ripetere dopo la prima raccolta, fino ad un massimo di tre trattamenti all'anno, ad intervalli di 7 giorni.

Compatibilità: in considerazione dell'uso, si sconsiglia la miscela con altri preparati.

Fitotossicità: in condizioni normali di ambiente e di impiego, se usato secondo le istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Avvertenze: poiché l'impiego del prodotto stimola la crescita vegetativa delle piante trattate, è necessario che tali piante siano provviste di una adeguata concimazione da impiegarsi in corrispondenza con l'uso del prodotto. In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Rischi di nocività: il prodotto, se impiegato secondo le istruzioni, non è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici ed il bestiame.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9,

comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

GIBAIFAR

Fitoregolatore idrodispersibile stimolante ad azione polivalente. Si impiega in trattamenti liquidi.

COMPOSIZIONE

-Acido Gibberellico puro g 2
-Solvente q.b. a g 100

**ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Registrazione Ministero della Salute n° 5282 del 16/3/1983

Titolare della Registrazione
AIFAR AGROCHIMICA SRL
Via Bazzano 12 - Ronco Scrivia (GE)
Tel.010.935.0267

Stabilimento di produzione: Aifar Agrochimica srl - Via Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia (GE)

Taglie: 100 mL

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Conservare fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme vigenti.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Aspettare che il prodotto applicato depositato sulla superficie delle foglie sia completamente asciugato prima di far rientrare i lavoratori. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO;
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI;
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

GIBAI FAR PFnPE

Fitoregolatore idrodispersibile stimolante ad azione polivalente. Si impiega in trattamenti liquidi.

COMPOSIZIONE

-Acido Gibberellico puro g 2
-Solvente q.b. a g 100

**ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Registrazione Ministero della Salute n° 5282 del 16/03/1983.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.

Titolare della Registrazione
AIFAR AGROCHIMICA SRL
Via Bazzano 12 - Ronco Scrivia (GE)
Tel.010.935.0267

Stabilimento di produzione: Aifar Agrochimica srl - Via Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia (GE)

Taglie: 100 mL

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Conservare fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme vigenti.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Aspettare che il prodotto applicato depositato sulla superficie delle foglie sia completamente asciugato prima di far rientrare i lavoratori. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti nelle operazioni di carico e miscelazione. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

MODALITÀ DI IMPIEGO

A causa della diversa rispondenza delle diverse colture/varietà e delle zone di coltivazione, si consiglia di effettuare un saggio su piccole superfici prima di utilizzare il prodotto su larga scala.

VITE: l'impiego del prodotto ha lo scopo di ingrossare e distanziare gli acini (con effetto sulla riduzione dello sviluppo delle infezioni da *Botrytis*), allungare il grappolo e migliorare la produzione.

Uva da tavola senza semi:

- per le varietà più sensibili, con trattamenti localizzati sul grappolo, utilizzare il prodotto alla dose di 2.5-100 mL/hL (0.5-6 g sa/ha). Effettuare al massimo 6 trattamenti per stagione ad intervalli di 2-3 giorni, durante la fase della fioritura e fino alla chiusura del grappolo;
- per varietà più resistenti, con trattamenti sull'intera coltura, utilizzare il prodotto alla dose di 200-312.5 mL/hL (40-50 g sa/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 7 giorni, durante la fase della fioritura e fino alla chiusura del grappolo.

Spruzzare i nuovi germogli quando questi hanno raggiunto una lunghezza di 5-10 cm.

Avvertenze: non variare la dose e non trattare in periodi diversi da quelli indicati.

Uva da tavola con semi: trattare allo scopo di:

- allungare il rachide: in pre-fioritura con tralci di 4-8 cm alla dose di 20-25 mL/hL (4 g sa/ha);
- diradare il grappolo: trattare al 30-40% della fioritura alla dose di 30-37.5 mL/hL (6 g sa/ha);
- per aumentare le dimensioni degli acini: dopo l'allegagione con acini di 3-4 mm di diametro, alla dose di 40-50 mL/hL (8 g sa/ha). Effettuare al massimo 4 trattamenti per stagione ad intervalli di 7 giorni.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sulla vite effettuare preferibilmente trattamenti diretti ai grappoli onde evitare eventuali influenze sfavorevoli sulle gemme dei tralci in formazione che si devono sviluppare nell'annata successiva.

AGRUMI: applicare il prodotto alla dose di 50 mL/hL (15 g sa/ha) al fine di:

- favorire l'allegagione: trattare quando la maggior parte dei fiori sono aperti e inizia la perdita dei petali;
- avere la buccia liscia e un ritardo di maturazione/colorazione: trattare poco prima della colorazione dei frutti, avendo cura di bagnare abbondantemente.

Effettuare al massimo 3 trattamenti all'anno ad intervalli di 7 giorni.

CARCIOFO: per anticipare l'epoca di raccolta impiegare il prodotto alla dose di 50 mL/hL (8 g sa/ha) effettuando il trattamento alla comparsa delle infiorescenze.

Il trattamento si può ripetere dopo la prima raccolta, fino ad un massimo di tre trattamenti all'anno, ad intervalli di 7 giorni.

Compatibilità: in considerazione dell'uso, si sconsiglia la miscela con altri preparati.

Fitotossicità: in condizioni normali di ambiente e di impiego, se usato secondo le istruzioni, il prodotto non è fitotossico.

Avvertenze: poichè l'impiego del prodotto stimola la crescita vegetativa delle piante trattate, è necessario che tali piante siano provviste di una adeguata concimazione da impiegarsi in corrispondenza con l'uso del prodotto. In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato

GIBAIFAR PF_nPE

Fitoregolatore idrodispersibile stimolante ad azione polivalente. Si impiega in trattamenti liquidi.

COMPOSIZIONE

-Acido Gibberellico puro g 2
-Solvente q.b. a g 100

**ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA**

Registrazione Ministero della Salute n° 5282 del 16/03/1983.

Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al 02/05/2020.

Titolare della Registrazione
AIFAR AGROCHIMICA SRL
Via Bazzano 12 - Ronco Scrivia (GE)
Tel.010.935.0267

Stabilimento di produzione: Aifar Agrochimica srl - Via Bazzano 12 - 16019 Ronco Scrivia (GE)

Taglie: 100 mL

Partita n.:

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Conservare fuori della portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. P501 Smaltire il prodotto/recipiente secondo le norme vigenti.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Aspettare che il prodotto applicato depositato sulla superficie delle foglie sia completamente asciugato prima di far rientrare i lavoratori. Indossare indumenti protettivi e guanti adatti nelle operazioni di carico e miscelazione. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO;
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI;
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO;**

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE