



OBSTHORMON 24a® (NAA 7,5%)

Fitoregolatore liquido anticascia per melo e pero e diradante per melo

N.Registrazione

Reg. N° 6322 del 03.04.1985 del Min. San.

Intervallo di sicurezza: 7 gg

Composizione

NAA (Acido alfa-naftilacetico) puro 7,5 g (84g/l)

Coformulanti q. b. a g. 100

Confezioni

FLACONI
24 x 300 ml
12 x 1 L

Descrizione prodotto

Fitoregolatore liquido anticascia per melo e pero e diradante per melo

Modalità d'uso

L'azione anticascia di OBSTHORMON 24a si manifesta entro 48 ore dalla sua applicazione e continua di regola per 15-20 giorni.

Avvertenze



Indicazioni di pericolo: H319 Provoca grave irritazione oculare. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.



Coltura	Impiego	Dosaggio	Tattamento
Melo azione diradante	Fogliare	18 ml/ha	Applicare alla fine della fioritura, dopo la completa caduta di tutti i petali, fino alla dimensione del frutto di circa 8-12 mm. Impiegare 1000 L/ha di soluzione.
Melo azione anticascia	Fogliare	30 ml/ha	Applicare con frutti al 90% della dimensione fino al termine della crescita e all'insorgere del colore cultivar-specifico per un massimo di due applicazioni. Impiegare 1000 L/ha di soluzione.
Melo azione contenimento vegetativo.	Fogliare	15 ml/ha	Applicare dallo stadio di frutto noce (con dimensione di circa 30 mm di diametro), durante l'ingrossamento dei frutti, per un massimo di tre applicazioni.
Pero azione Anticascia	Fogliare	24 ml/ha	Applicare con frutti al 90% della dimensione fino al termine della crescita e all'insorgere del colore cultivar-specifico per un massimo di due applicazioni. Impiegare 1000 L/ha di soluzione.

Note aggiuntive prodotto

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle Indicazioni di pericolo ed i consigli di prudenza riportati in etichetta.