

Boost your crop

syngenta®
Biologicals

NUTRITIONAL CROP BOOSTER

MC Set™



FRANÇAIS | ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL LIQUIDE K 3,5

Informations complémentaires: MC SET favorise la floraison et la nouaison.

Teneurs en éléments nutritifs déclarées en masse: 3,5% (42,3 g/l) d'oxyde de potassium (K₂O) total: 3,5% (42,3 g/l) d'oxyde de potassium (K₂O) soluble dans l'eau; 0,5% (6,05 g/l) de Bore (B) issu d'éthanolamine de bore, soluble dans l'eau; 1,5% (18,1 g/l) de Zinc (Zn) soluble dans l'eau chélaté par EDTA; 10% (121,0 g/l) Carbone organique (Corg). 39,4% Matière sèche*. Le zinc chélaté par EDTA est stable dans la plage de pH 4-10.

*Teneur en azote organique (Norg) d'origine végétale non inférieure à 1,5%.

Ingrédients: Vinasse EC n° 932-215-9 (CMC 6: Sous-produits de l'industrie alimentaire); EDTA de zinc EC sel disodique n° 237-865-0 (CMC 1: Substances et mélanges à base de matières vierges); Extrait d' *Ascophyllum nodosum* EC n° 283-907-6 (CMC 1); Produits de réaction du monoéthanolamine et de l'acide borique (1:3) EC n° 701-024-0 (CMC 1).

Formulation: Liquide

Instructions d'utilisation: Application foliaire. Arbres fruitiers: 1-2 l/ha (de la floraison à la chute des pétales, 2 traitements ou plus selon le cycle de culture). Légumes: 150-200 ml/100 l (de la floraison à la chute des pétales, 2 traitements ou plus selon le cycle de culture).

À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application. USAGE PROFESSIONNEL: Contactez votre représentant local Syngenta pour des recommandations plus spécifiques. www.syngentabiologicals.com. Ces doses d'application du produit sont des recommandations. Nous recommandons aux agriculteurs de consulter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation.

Conditions de stockage recommandées: Bien mélanger avant utilisation. Si stocké entre 0 et 35°C, le produit ne présente aucun problème de conservation.

Informations sur la sécurité et l'environnement: Pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement, veuillez respecter les instructions d'utilisation recommandées de ce produit fertilisant.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. Zona Industriale Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy Tel. (+39) 0872 8811

ITALIANO | CONCIME ORGANO-MINERALE LIQUIDO K 3,5

Informazioni supplementari: MC SET favorisce i processi di fioritura e allegagione della pianta.

Tenore dichiarato di nutrienti in massa: 3,5% (42,3 g/l) Ossido di potassio (K₂O) totale: 3,5% (42,3 g/l) Ossido di potassio (K₂O) idrosolubile; 0,5% (6,05 g/l) Boro (B) come monoetanolammina borato, idrosolubile; 1,5% (18,1 g/l) Zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile. 10% (121,0 g/l) Carbonio organico (C org). 39,4% Materia secca*. Zinco chelato con EDTA è stabile nell'intervallo di pH 4-10. *Contenuto di Azoto organico (N org) di origine vegetale non inferiore a 1,5%.

Ingrédients: Borlanda n. EC 932-215-9 (CMC 6: Sottoprodotti dell'industria alimentare); Zinco EDTA sale disodico EC 237-865-0 (CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo); *Ascophyllum nodosum*, estratto n. EC 283-907-6 (CMC 1); Prodotti di reazione di monoetanolammina e acido borico (1:3)n. EC 701-024-0 (CMC 1).

Formulazione: Liquida

Istruzioni d'uso: Applicazione fogliare. Colture frutticole e vite: 1-2 l/ha (da pre-fioritura fino alla caduta dei petali, 2 o più trattamenti a seconda del ciclo colturale). Colture orticole: 150-200 ml/100 l (da pre-fioritura fino alla caduta dei petali, 2 o più trattamenti a seconda del ciclo colturale).

Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione. PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI: Per raccomandazioni più specifiche, contattare il vostro rappresentante locale Syngenta. www.syngenta.it. Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti.

Condizioni di immagazzinaggio raccomandate: Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Immagazzinato tra 0 e 35°C, il prodotto non presenta problemi di conservazione.

Informazioni sulla sicurezza e sull'ambiente: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante.

Fabbricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ENGLISH | LIQUID ORGANO-MINERAL FERTILISER K 3,5

MC SET favours flowering and fruit set.

Declared nutrient content by mass: 3,5% (42,3 g/l) Total Potassium Oxide (K₂O): 3,5% (42,3 g/l) water soluble Potassium Oxide (K₂O); 0,5% (6,05 g/l) water soluble Boron (B), from monoethanolamine borate; 1,5% (18,1 g/l) water soluble Zinc (Zn), chelated by EDTA; 10% (121,0 g/l) Organic carbon (Corg). 39,4% Dry matter*. Zinc chelated by EDTA is stable in the pH range 4-10.

*Content of Organic nitrogen (Norg) of vegetable origin not less than 1,5%.

Ingrédients: Vinasse EC n° 932-215-9 (CMC 6: Food industry by-products); Zinc EDTA disodium salt EC n° 237-865-0 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); *Ascophyllum nodosum* extract EC n° 283-907-6 (CMC 1); Reaction products of monoethanolamine and boric acid (1:3) EC n° 701-024-0 (CMC 1).

Formulation: Liquid

MODE OF APPLICATION



FOLIAR



Powered by



GEAPOWER®

Instructions and application rates: Foliar application. Fruit trees: 1-2 l/ha (from flowering to petal drop, 2 or more treatments according to crop cycle). Vegetables: 150-200 ml/100 l (from flowering to petal drop, 2 or more treatments according to crop cycle).

To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.

PROFESSIONAL USE: For more specific recommendations, contact your local Syngenta representative. www.syngentabiologicals.com. These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their adviser to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation.

Recommended Storage Conditions: Thoroughly mix before use. If stored between 0-35°C, the product does not have any storage problems.

Information on Safety and Environment: To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product.

Manufacturer: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ESPAÑOL | ABONO ORGANO-MINERAL LÍQUIDO K 3,5

MC SET favorece la floración y el cuajado de frutos.

Contenidos declarados de nutrientes en masa: 3,5% (42,3 g/l) Óxido de potasio total (K_2O): 3,5% (42,3 g/l) Óxido de potasio (K_2O) soluble en agua; 0,5% (6,05 g/l) Boro (B) soluble en agua procedente de etanolamina de boro; 1,5% (18,1 g/l) Zinc (Zn) soluble en agua quelado por EDTA; 10% (121,0 g/l) Carbono orgánico (Corg). 39,4% Materia seca*.

El zinc quelado por EDTA es estable en el rango de pH 4-10.

*Contenido de nitrógeno orgánico (Norg) de origen vegetal no inferior al 1,5%.

Ingredientes: Vinaza EC n.º 932-215-9 (CMC 6: Subproductos de la industria alimentaria); EDTA de zinc sal disódica CE n.º 237-865-0 (CMC 1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes); Extracto de *Ascochyllum nodosum* EC n.º 283-907-6 (CMC 1); Productos de reacción de monoetanolamina y ácido bórico (1:3) EC n.º 701-024-0 (CMC 1).

Formulación: Líquida

Instrucciones de uso y dosis de aplicación: Aplicación foliar. Cultivos leñosos: 1-2 l/ha (desde la floración hasta la caída de pétalos, 2 o más tratamientos según el ciclo de cultivo). Hortícolas:

150-200 ml/100 l (desde la floración hasta la caída de pétalos, 2 o más tratamientos según el ciclo de cultivo). Cultivos de flores: 150-200 ml/100 l (2-3 aplicaciones durante la fase final del ciclo). Riego: 3-5 l/ha.

Utilizar solo cuando exista una necesidad reconocida. No exceder la dosis de aplicación. USO

PROFESSIONAL: Contacte con su representante local de Syngenta para recomendaciones más específicas. www.syngentabiologicals.com. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Recomendamos a los agricultores que busquen el consejo de su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar la sobre-fertilización.

Condiciones de almacenamiento recomendadas: Mezclar bien antes de usar. Si se almacena entre 0-35°C, el producto no presenta problemas de conservación.

Información sobre Seguridad y Medio Ambiente: Para evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente, cumpla con las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

PORTUGUÊS | ADUBO ORGANOMINERAL LÍQUIDO K 3,5

Informações complementares: MC SET favorece a floração e o vingamento dos frutos.

Teor declarado de nutrientes em massa: 3,5% (42,3 g/l) Óxido de potássio total (K_2O): 3,5% (42,3 g/l) Óxido de potássio (K_2O) solúvel em água; 0,5% (6,05 g/l) Boro (B) solúvel em água, a partir de etanolamina de boro; 1,5% (18,1 g/l) Zinco (Zn) solúvel em água, quelatado por EDTA; 10% (121,0 g/l) Carbono orgânico (Corg). 39,4% Matéria seca*.

O zinco quelatado por EDTA é estável no intervalo de pH 4-10.

*Teor de azoto orgânico (Norg) de origem vegetal não inferior a 1,5%.

Ingredientes: Vinhaça CE n.º 932-215-9 (CMC 6: Subprodutos da indústria alimentar); EDTA de zinco sal dissódico CE n.º 237-865-0 (CMC 1: Substâncias e misturas); Extrato de *Ascochyllum nodosum* CE n.º 283-907-6 (CMC 1); Produtos de reação de monoetanolamina e ácido bórico (1:3) CE n.º 701-024-0 (CMC 1).

Formulação: Líquida

Indicações relativas à sua utilização: Aplicação foliar. Árvores de fruto: 1-2 l/ha (desde a floração até à queda das pétalas, 2 ou mais tratamentos de acordo com o ciclo da cultura). Hortícolas: 150-200 mL/100 L (desde a floração até à queda das pétalas, 2 ou mais tratamentos de acordo com o ciclo da cultura).

Utilizar apenas quando houver uma necessidade reconhecida. Não exceder a dose de aplicação.

USO PROFESSIONAL: Contacte o seu representante local da Syngenta para recomendações mais específicas. www.syngentabiologicals.com. Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Recomenda-se a consulta junto do serviço técnico da empresa ou distribuidor para ajustar as recomendações à sua situação particular e evitar a fertilização excessiva.

Condições de armazenamento recomendadas: Misturar bem antes de usar. O produto é estável se for armazenado entre 0°C e 35°C.

Informação relativa à segurança e ao ambiente: Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

MC SET

FR I EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande. **IT I EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. **EN I EUH208** Contains 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. May produce an allergic reaction. EUH210 Safety data sheet available on request. **ES I EUH208** Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. **PT I EUH208** Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica. EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Distributore in Italia: Syngenta Italia S.p.A., Viale Fulvio Testi 280/6 - Milano - Tel. 02-33444.1

Distribuidor en España: Syngenta España, S.A., c/ Ribera del Loira, 8 - 10, 28042 - MADRID, España. Teléfono: (+34) 91 387 64 10

Distribuidor em Portugal: Syngenta Crop protection - Soluções para a Agricultura, Lda, Av. D. João II Edifício Adamastor, Torre B, nº9-I, 13º piso 1990-079 Lisboa Tel. 21 794 32 00 www.syngenta.pt

Manufacturer / Fabbricante / Fabricant / Fabricante / Fabricante: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Volume, Volumen (10 l) / net weight, peso netto, masse nette, peso neto, peso líquido (12 kg)

Production date - production batch: see print on package / **Data di produzione - Lotto di produzione:** vedi stampa su confezione. / **Date de production - lot de production:** voir impression sur l'emballage / **Fecha de producción - lote de producción:** ver impresión en el envase / **Lote e Data de produção:** ver embalagem

Expiry Date: 3 years from production date / **Data di scadenza:** 3 anni dalla data di produzione / **Date de péremption:** 3 ans à partir de la date de fabrication / **Fecha de caducidad:** 3 años desde la fecha de fabricación / **Data de validade:** 3 anos a partir da data de produção

Dispose properly of packaging after use / Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso / Eliminer correctement l'emballage après utilisation / Decharar adecuadamente el envase después de su uso / A embalagem vazia deve ser depositada num ponto de receção destinado a esse fim.

Foliar application / Applicazione fogliare / Application foliaire / Aplicación foliar / Aplicação foliar



TAMCA	TAPPO
HDPE 2	HDPE 2

