

PROXIMO



**INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA
ATTIVO SIA PER CONTATTO CHE PER INGESTIONE**

COMPOSIZIONE: Pyriproxifen g 10,8 (= 100 g/L)
FORMULAZIONE: Concentrato emulsionabile
CLASSIFICAZIONE: Pericolo H304; H315; H317; H318; H410;
EUH401
REGISTRAZIONE: Ministero della Salute n. 16376 del 25.11.2015
CONFEZIONI: Bottiglia da 1 L Cartone 12x1 L



CARATTERISTICHE

PROXIMO è un insetticida regolatore di crescita attivo per contatto e per ingestione. Il prodotto agisce sullo sviluppo dell'insetto inibendo i naturali processi evolutivi come la metamorfosi, l'embriogenesi e la riproduzione.

VANTAGGI

L'efficacia e la elevata persistenza del prodotto se impiegato secondo quanto prescritto consente il controllo duraturo degli insetti bersaglio e quindi su Pomacee e Drupacee è sufficiente un solo trattamento per stagione.

MODALITÀ DI IMPIEGO			
Coltura	Avversità	Dosi d'impiego per hl	Note
Pomacee e Drupacee	Cocciniglia di S. José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	ml 40-50 (max 0,5 L/ha)	Trattare in pre-fioritura utilizzando volumi di acqua di 700-1.000 L/ha
Agrumi	Cocciniglia rossa, Cocciniglia grigia, Cocciniglia bianca del limone, Cocciniglia elmetto, Cocciniglia serpetta, Cocciniglia a virgola	ml 40-50 (max 1,125 L/ha)	Trattare tra maggio e giugno o tra agosto e settembre alla comparsa delle prime forme larvali, preferibilmente di prima generazione. Utilizzare volumi di acqua di 1.000-2.250 L/ha
Pomodoro in serra	Mosche bianche (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	ml 50-75 (max 1,125 L/ha)	Intervenire alla comparsa degli adulti massimo due trattamenti per stagione utilizzando volumi di acqua di 1.000-1.500 L/ha

COMPATIBILITÀ - AVVERTENZE

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SUL POMODORO E 30 GIORNI SU AGRUMI.

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.